

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO  
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO 002/2022

Divisão de Dados Epidemiológicos e Ambientais

## **LIRA***a*

Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti*  
(Incluindo levantamento sobre o *Aedes albopictus*)

**RELATÓRIO ABRIL DE 2022**

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2022.

O Levantamento de Índice Rápido para o *Aedes aegypti* (LIRAa), como descrito em seu nome, foi idealizado com vistas ao monitoramento da população (e dispersão) do vetor da Dengue. Contudo, com a introdução da Febre de Chikungunya em nosso país, a metodologia passou a ser adotada também para o monitoramento do *Aedes albopictus*, que também é capaz de transmitir a doença.

A Febre de Chikungunya é uma doença parecida com a Dengue, causada pelo vírus **CHIKV**, da família *Togaviridae*, que tem seu modo de transmissão também pela picada do mosquito *Aedes aegypti* infectado e, menos comumente, pelo mosquito *Aedes albopictus*, justificando a importância deste monitoramento, visto que, ambas as espécies têm todas as condições de espalhar esses vírus durante o verão.

O LIRAa, realizado periodicamente pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro, fornece o Índice de Infestação Predial (IIP) e o Índice de Infestação em Depósitos (Índice de Breteau – IB) do *Aedes aegypti* e do *Aedes albopictus*, isso o torna um importante instrumento de orientação, pois identifica as áreas prioritárias para medidas e ações estratégicas de controle e combate ao mosquito, visando à redução dos índices de infestação municipais e, conseqüentemente, o controle da Dengue e da Febre de Chikungunya. Em cada município, agentes de saúde visitam residências e outros tipos de imóveis, para inspecionar e identificar os criadouros, e ao encontrar, coletar as larvas ou pupas para análise em laboratório.

De acordo com as **Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue** (2009), os parâmetros para classificação dos estratos e dos municípios, quanto à infestação pelo *Aedes aegypti* (também adotados para o *Aedes albopictus*), são:

- Menor que 1%: **SATISFATÓRIO** | De 1% e 3,99%: **ALERTA** | Acima de 3,99%: **RISCO**.

### Plano Nacional de Enfrentamento da Microcefalia

O Ministério da Saúde suspendeu a **Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)** no final do 3º ciclo de visitas domiciliares, 30 de junho de 2017. Contudo, a estratégia de trabalho adotada será mantida (**Salas de Coordenação e Controle**), permanecendo a realização de ações integradas entre os setores dos três níveis de governo, envolvendo aqueles atores que têm em suas missões, papel relevante e/ou impactante no controle do vetor.

### Retomada das ações pós pandemia

A partir de 2022 o Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação de Geral de Arboviroses (CGArb), revogou as portarias e notas informativas relacionadas à suspensão/flexibilização das ações de controle dos vetores das arboviroses.

### Febre Amarela

Sem ocorrência recente de casos. Contudo, mantém-se a necessidade de fortalecer as ações de controle de vetores, em particular, nos municípios onde a cobertura vacinal para a febre amarela permanece baixa.

### Cenário Epidêmico

No momento deste levantamento, observando as taxas de incidência de arboviroses, identificamos que **04 regiões** apresentam municípios com cenário epidêmico para arboviroses: **Metropolitana I, Noroeste, Norte e Serrana**.

Importante registrar que o levantamento de janeiro de 2022 foi facultativo, por decisão da SES-RJ, por força das fortes chuvas de atingiram o estado e também pelo aumento significativo dos casos de Covid-19 no período. Fato que reduziu fortemente o número de municípios que realizaram o levantamento.

## Levantamento do *Aedes aegypti*

Em 2022, o segundo levantamento foi realizado na 14ª semana epidemiológica, compreendida entre os dias 03 e 09 de abril.

Com base nas informações recebidas dos municípios, configurou-se o seguinte cenário para o Estado:

- Dos 92 municípios, 75 (81,5%) informaram a realização do levantamento. Destes, 34 (45,3%) classificados como satisfatórios e 38 (50,7%) em alerta e 03 (4,0%) em risco. Neste ciclo, 17 municípios não informaram (18,5%).
- Foram pesquisados 772 estratos amostrais. Destes, 416 (53,9%) classificados como satisfatórios, 313 (40,5%) em alerta e 43 (5,6%) em risco, estes últimos, distribuídos em 14 (18,7%) municípios.

### Municípios que apresentaram estratos classificados com Risco, por região (06):

#### Metropolitana I (04):

- ... Itaguaí (09 estratos: 0 satisfatório, 07 em alerta e 02 em risco);
- ... Nova Iguaçu (53 estratos: 19 satisfatórios, 29 em alerta e 05 em risco);
- ... Rio de Janeiro (249 estratos: 127 satisfatórios, 116 em alerta e 06 em risco);
- ... São João de Meriti (26 estratos: 12 satisfatórios, 12 em alerta e 02 em risco).

#### Metropolitana II (02):

- ... Itaboraí (12 estratos: 6 satisfatório, 5 em alerta e 01 em risco);
- ... Tanguá (03 estratos: 02 satisfatórios, 0 em alerta e 01 em risco).

#### Baixada Litorânea (03):

- ... Araruama (11 estratos: 06 satisfatórios, 04 em alerta e 01 em risco);
- ... Armação dos Búzios (12 estratos: 0 satisfatório, 03 em alerta e 05 em risco);
- ... Iguaba Grande (04 estratos: 0 satisfatório, 0 em alerta e 04 em risco).

#### Médio Paraíba (02):

- ... Resende (11 estratos: 03 satisfatórios, 07 em alerta e 01 em risco);
- ... Volta Redonda (12 estratos: 0 satisfatório, 07 em alerta e 05 em risco).


#### Noroeste Fluminense (02):

- ... Bom Jesus de Itabapoana (03 estratos: 0 satisfatório, 01 em alerta e 02 em risco);
- ... Miracema (05 estratos: 0 satisfatório, 04 em alerta e 01 em risco).


#### Norte Fluminense (01):

- ... Campos dos Goytacazes (19 estratos: 02 satisfatórios, 09 em alerta e 08 em risco).

Mapa do LIRAa: Índice de Infestação Predial para *Aedes aegypti*: abril de 2022



Distribuição de estratos do LIRAa por classificação e por região: abril de 2022



Observamos que **06** das **09** regiões apresentam estratos em alto risco, colocando os municípios que fazem fronteira entre si e com outros estados em alerta, pela possibilidade de propagação do vetor nessas regiões.

**Como não foi realizado o LIRAa de abril de 2021, devido ao período de suspensão provocado pela pandemia de Covid-19, não foi possível realizar a comparação sazonal.**

**Obs.:** A persistência de estratos em risco aponta a fragilidade na cobertura ou na qualidade do trabalho realizado pelos municípios na visita domiciliar. Considerando o trabalho realizado no ano anterior, não era para ocorrer estratos em alto risco e os índices de infestação deveriam estar bem mais próximos de **1%**: (**SATISFATÓRIO**). No entanto, considerando o cenário de pandemia e a recomendação de flexibilização das visitas domiciliares, esperava-se um aumento maior da dispersão e dos índices de infestação, em especial, do *Ae. aegypti*.

Os **13** municípios que apresentaram os maiores Índices de Infestação Predial foram: **Iguaba Grande (6,5%), Bom Jesus de Itabapoana (4,6%), Armação de Búzios (4,0%), Tanguá (3,9%), Trajano de Moraes (3,9%), Campos dos Goytacazes (3,9%), Volta Redonda (3,3%), Carmo (3,2%), Itaguaí (3,1%), Miracema (2,9%), Rio Claro (2,6%), São José de Ubá (2,2%) e Cambuci (2,1%).**

Municípios (**08**) que apresentaram índice zero: **Bom Jardim, Comendador Levy Gasparian, Duas Barras, Macuco, Natividade, Pinheiral, Quissamã e Sumidouro.**

**É importante registrar que o volume de chuvas e a temperatura elevada influenciam diretamente no aumento da população de mosquitos.**

A sazonalidade tem grande impacto no LIRAa, isto porque o clima interfere diretamente no comportamento e na reprodução do vetor, logo, não se deve comparar os IIP de períodos distintos. No entanto, é possível utilizar alguns resultados do levantamento imediatamente anterior como parâmetro. Neste caso, comparado ao realizado **em janeiro de 2022**, observa-se aumento no número de municípios classificados como **satisfatório**, de **20** para **34**, também nos em **alerta**, de **16** para **38**, já para os em **risco**, apresentou redução de **04** para **03**.

O Estado do Rio de Janeiro está na classificação de **ALERTA (1,3%)**.

**Depósitos predominantes** (onde foram encontrados focos do vetor com mais frequência):




Observamos que os depósitos do tipo **A2**, **B**, **C** e **D2** são responsáveis por **84,5%** dos **3.917** criadouros encontrados neste levantamento, evidenciando o desafio de prover um serviço público de qualidade, com foco na cobertura e na sua suficiência e de sensibilizar a população quanto à importância do seu papel na prevenção e eliminação de prováveis criadouros do vetor.

#### Características dos depósitos predominantes identificados:

- ... **A2**: refere-se ao recipiente usado como reservatório de água, complementar, para consumo humano, o que reflete a deficiência no sistema de abastecimento, fato que **aponta para uma ação integrada dos setores do poder público, não dependendo apenas dos ocupantes do imóvel.**
- ... **B**: refere-se aos depósitos móveis - vasos/frascos com água, prato, garrafas, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção (sanitários estocados e outros), objetos religiosos. Para esse tipo de depósito as soluções **são de responsabilidade dos ocupantes do imóvel**, pois requerem ações cotidianas de inspeção dos seus ambientes, para eliminação de possíveis criadouros do mosquito.
- ... **C**: refere-se aos depósitos fixos - tanques em obras, borracharias e hortas, calhas, lajes e toldos em desníveis, ralos, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, fontes ornamentais; floreiras / vasos em cemitério; cacos de vidro em muros, outras obras arquitetônicas (caixas de inspeção / passagens). **Requerem ações tanto dos ocupantes do imóvel, quanto do poder público.**
- ... **D2**: refere-se ao lixo (recipientes plásticos, garrafas, latas); sucatas em pátios e ferro velhos (PE), entulhos em construção. **Requer ações dos ocupantes do imóvel**, armazenando corretamente seu lixo, **e do poder público**, mantendo a regularidade da coleta e monitorando os locais de armazenamento de sucatas e de reciclagem.

#### Depósitos predominantes por região




### Levantamento do *Aedes albopictus*

O presente levantamento tem como objetivos, descrever e analisar a evolução da infestação pelo *Aedes albopictus* nas regiões urbanas dos municípios e discutir seu possível papel de elo entre as formas silvestre e urbana da transmissão do vírus.

O vetor consegue se dispersar muito bem entre a mata e a cidade. Como existem vários vírus circulando em ambiente silvestre, o *Ae. albopictus*, por sua característica exofílica, se torna um vetor com potencial para se infectar com um vírus silvestre e levar este vírus para o ambiente urbano.

Esse mosquito tem demonstrado elevada capacidade para utilizar uma ampla variedade de criadouros artificiais no território urbano, sem abandonar ecótopos naturais. As formas imaturas desse mosquito nas áreas urbanas se mantêm, principalmente, em pneus, caixa d'água, vasos de plantas, latas, garrafas, bebedouros de animais e/ou ainda outros objetos que retenham água (Ministério da Saúde, 1998).

### Mapa do LIRAa: Índice de Infestação Predial para *Aedes albopictus*: abril de 2022.




Dos 75 municípios que informaram o LIRAa, o vetor foi encontrado em 55 (73,3%), evidenciando sua presença em todas as regiões do Estado, como mostra o mapa acima. **Como não foi realizado o LIRAa de abril de 2021, devido ao período de suspensão provocado pela pandemia de Covid-19, não foi possível realizar a comparação sazonal.**

Os 08 municípios que apresentaram os maiores Índices de Infestação Predial para *Aedes albopictus* foram: Rio Bonito (4,3%), Iguaba Grande (3,9%), Guapimirim (3,7%), Bom Jesus de Itabapoana (2,9%), Tanguá (2,9%), Silva Jardim (2,8%), Itaguaí (2,3%) e Conceição de Macabu (2,3%).

A intensidade e a dispersão do vetor, observada neste levantamento, indica que o monitoramento deve ser permanente, considerando a ocorrência de arboviroses em nosso Estado, como a Febre de Chikungunya, da qual o *Aedes albopictus* também é transmissor.

**Mapa do LIRAa: Presença simultânea dos vetores *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em áreas urbanas: abril de 2022.**



O mapa acima destaca os municípios onde há a presença simultânea dos vetores em áreas urbanas, fato que acentua o grau de risco de transmissão de arboviroses, principalmente da Febre de Chikungunya, considerando que o *Aedes albopictus* transita entre as áreas urbana e rural, é importante que estes municípios estendam sua área de cobertura para além dos limites das áreas urbanas, enquanto houver residências e a presença do vetor.

**Suporte Técnico Estadual do LIRAa:**

Tel.: (21) 2332.2352 / 2332.2426

E-mail: egi.fad@gmail.com / liraa.ses@gmail.com

Contatos: **Jorge Freitas / Marcello Bahouth**

**DivDEA - Divisão de Dados Epidemiológicos e Ambientais:**

Rua México, 128 Sala 425 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ

Tel.: (21) 2333.3914 / 2332.9308

E-mail: milton.araujo@saude.rj.gov.br

Diretor: **Milton Carlos da Silva Araujo**