



GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE
SAÚDE

Campanha Nacional de Multivacinação - 2017



Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação - 2017

- ✓ **Data:** 11/09/2016 a 22/09/2016 (Dia “D”: 16/09/2016);
- ✓ **Público alvo:** crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias);
- ✓ **Objetivo Geral:** Resgatar não vacinados ou completar esquemas de vacinação;
- ✓ **Objetivos Específicos:**
 - Oportunizar o acesso às vacinas oferecidas pelo PNI;
 - Melhorar as coberturas vacinais e homogeneidade;
 - Contribuir na redução da incidência das doenças imunopreveníveis.
 - Manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis (ex: poliomielite e sarampo);



Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação - 2017

- ✓ **Meta:** Vacinar de forma **seletiva** o público alvo
- ✓ **Estratégia:** avaliação caderneta de vacinação e atualização do esquema vacinal conforme situação encontrada.

Registro de doses

- ✓ Registro consolidado (obrigatório) – sipni.datasus.gov.br (a partir de 11/09 até o dia 02/10/2017);





Vacinas para crianças menores de 1 ano

- ✓ BCG
- ✓ Meningocócica C
- ✓ Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções respiratórias)
- ✓ Pneumo 10
- ✓ Pólio
- ✓ VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)

Vacinas em 1 ano de idade

- ✓ Tríplice viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba)
- ✓ Hepatite A
- ✓ Tetraviral (Tríplice + varicela)



CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE – 2017

VACINA	ESQUEMA	OBS
HPV	2 doses (0, 6 meses)	Recomendada para meninas entre 9 e 14 anos de idade.
		Recomendada para meninos entre 11 e 14 anos de idade.
HEPATITE B	3 doses (0, 1 e 6 meses) - considerar doses anteriores	Avaliação da dose por faixa etária conforme fabricante.
DUPLA ADULTO (dT) – difteria e Tétano	Reforço a cada 10 anos - considerar doses anteriores de Penta e DTP	Em caso de gestantes, consultar esquema de dTpa.
dTpa – para gestante	1 dose ou reforço	Recomendada para gestantes (20ª a 36ª semana de IG) e puerpério imediato - considerar doses anteriores de dT.
TRÍPLICE VIRAL (Sarampo, Rubéola e Caxumba)	2 doses (intervalo mínimo de 30 dias entre as doses) - considerar doses anteriores	Esquema recomendado até 19 anos.
MENINGO C CONJUGADA	1 dose ou reforço	Recomendada para meninas e meninos de 12 a 13 anos de idade



Campanha de vacinação contra a Raiva Animal - 2017

Data: 07 de Outubro de 2017

Objetivo: Evitar casos de raiva canina e a sua transmissão para humanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar vacinação anti-rábica na população canina e felina nos municípios do estado de forma a imunizar 80% destes animais.



OBRIGADA!!

- Gerência de Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Respiratória
 - - GDITR/CVE /SVS/SES-RJ -

